

วัคซีนที่ใช้ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

เนื่องจากในปัจจุบันเราใช้วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ชนิดที่ทำจากเซลล์เพาะเลี้ยง (ฉีด ๕ ครั้งเท่านั้น) เพราะมีประสิทธิภาพสูง ไม่ทำให้เกิดอาการแพ้ต่อ ระบบประสาท และควรฉีดเซรุ่มร่วมด้วย ถ้า บาดแผลมีเลือดออก ถูกเลียที่ริมฝีปาก น้ำลาย กระเด็นเข้าตา สถานเสาวภาใช้โปรแกรมการฉีดวัคซีน ๒ แบบ คือ แบบปกติฉีดเข้ากล้ามเนื้อ และแบบประหยัดฉีดเข้า ชันผิวหนัง แต่ละแบบจะได้รับการฉีดวัคซีน ทั้งหมด ๕ ครั้ง

เซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นอย่างไร ?

เซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นเซรุ่มส่วนของ นำใสของเลือดที่ได้จากม้าหรือคนที่ได้รับการฉีด วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ในเซรุ่มจะมีโปรตีนที่ทำหน้าที่เป็นภูมิคุ้มกันต่อไวรัสโรคพิษสุนัขบ้าใน ปริมาณที่มาก เซรุ่มจะไปทำลายเชื้อไวรัสในร่างกาย ของผู้ที่ถูกสุนัขบ้ากัด โดยการฉีดรอบ ๆ แผลก่อนที่จะ ก่อโรค และก่อนที่ภูมิคุ้มกันของร่างกายจะ สร้างขึ้น ด้วยเหตุนี้การให้เซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าร่วมกับการฉีดวัคซีนเข็มแรก จึงเป็นวิธีที่จะป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ผลดีที่สุด ทุกวันเวลาราชการ



ประโยชน์ของการฉีดวัคซีนป้องกันล่วงหน้า

๑. เมื่อถูกสัตว์กัด การฉีดวัคซีนกระตุ้นเพียง ๑ - ๒ เข็ม ร่างกายก็จะได้ภูมิคุ้มกันที่เพียงพอจะป้องกันโรคอย่างได้ผล
๒. ไม่เสี่ยงต่อการแพ้เซรุ่ม หรือเจ็บปวดจากการฉีด เซรุ่มรอบ ๆ แผล

สัตว์ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าจะมีอาการอย่างไร ?

พบได้ ๒ แบบคือ

๑. แบบดุร้าย มีอาการหงุดหงิด ไล่กัดคนและสัตว์อื่น ๆ ถ้าถูกโชหรือกักขังไว้ในกรง จะกัดโช กรง หรือ สิ่งของที่อยู่ใกล้เคียงดุร้าย เมื่อแสดงอาการดุร้ายได้ ๒ - ๓ วัน ก็จะอ่อนเพลียลง ขาหลังไม่มีแรง เดินโซเซ และตายในที่สุด
๒. แบบเซื่องซึม มีอาการปากอ้าหุบไม่ได้ ลิ้นมีสีแดงคล้ำ บางครั้งมีสิ่งสกปรกติดอยู่และลิ้นห้อยออกมานอกปาก มีอาการคล้ายกระดูกติดคอ สุนัขจะเอาขาหน้าตะกุก บริเวณแก้มปากและคอบวม สุนัขจะลุกนั่ง ยืนและเดิน ไปมาบ่อย ๆ



การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

(Rabies virus)

อบต.โคกหินแฮ่




สำนักปลัด อบต.โคกหินแฮ่

๐๔๒ - ๕๓๐๘๓๑

โรคพิษสุนัขบ้าคืออะไร

โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำ เป็นโรคติดต่อร้ายแรงชนิดหนึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสชื่อ เรบีส ไวรัส (Rabies) ทำให้เกิดโรคได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด เช่น คน สุนัข แมว ลิง ชะนี กระรอก ค้างคาว ฯลฯ โรคนี้เมื่อเป็นแล้วจะทำให้ มีอาการทางประสาท โดยเฉพาะระบบประสาท ส่วนกลาง และถ้าเป็นแล้วเสียชีวิตทุกราย ใน ปัจจุบันยังไม่มียาอะไรที่จะรักษาโรคพิษสุนัขบ้า ได้ เชื้อไวรัส

เรบีส (Rabies)



คนติดโรคพิษสุนัขบ้าจากทางใดได้บ้าง?

คนเป็นโรคพิษสุนัขบ้าเนื่องจากได้รับเชื้อ โรคพิษสุนัขบ้าจากสัตว์ที่เป็นโรค คนสามารถติด โรคจากสัตว์เหล่านี้ได้ 2 ทางคือ

1. ถูกสัตว์ที่เป็นโรคกัด เชื้อไวรัสจากน้ำลายของสัตว์ที่เป็นโรคจะเข้าสู่ร่างกายทางบาดแผลที่ถูกกัด
2. ถูกสัตว์ที่เป็นโรคเลีย โดยปกติคนถูกสัตว์ที่เป็นโรคเลีย จะไม่ติดโรคจากสัตว์เหล่านั้น นอกเสียจากว่า บริเวณที่ถูกเลียจะมีบาดแผลหรือรอยถลอกหรือรอยขีด ข่วน โดยคนนั้นไม่ได้สังเกต ในกรณีนี้จะทำให้สามารถ เป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้ รวมทั้งถูกเลียที่ริมฝีปากหรือ นัยน์ตา

คนที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้า จะมีอาการอย่างไร ?

ในระยะ ๒ - ๓ วันแรก อาจมีไข้ต่ำ ๆ ต่อไปจะมีอาการ เจ็บคอ เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย คั่นหรือปวดแสบปวดร้อน ตรงบริเวณแผลที่ถูกกัด ทั้ง ๆ ที่แผลอาจหายเป็นปกติ แล้ว ต่อไปจะมีอาการ ตื่นเต้นง่าย กระสับกระส่าย ไม่ ชอบแสงสว่าง ไม่ชอบลม และไม่ชอบเสียงดัง กลืนลำบาก แม้จะเป็นของเหลวหรือน้ำ เจ็บมากเวลากลืน เพราะการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อที่ใช้ในการกลืน แต่ยังมีสติพูดจำรูเรื่อง ต่อไปจะอะอะมากขึ้น และสุดท้ายอาจมี อาการชัก เป็นอัมพาต หมดสติ และ

เสียชีวิต เนื่องจาก ส่วนที่สำคัญของสมองถูกทำลายไปหมด

จะอย่างไรเมื่อถูกสัตว์กัด

1. ล้างแผลด้วยน้ำสบู่หลายๆ ครั้ง
2. ใส่ยาใส่แผล เช่น แอลกอฮอล์ จะช่วยฆ่าเชื้อโรค อย่าใส่สิ่งอื่น เช่น เกลือ ยาฉุนลงในแผล
3. กักสัตว์ที่กัดไว้ดูอาการอย่างน้อย ๑๐ วัน เว้นแต่สัตว์นั้น ดุร้าย กัดคน หรือสัตว์อื่น หรือไม่ สามารถกักสัตว์ไว้ได้ให้ทำลาย ถ้าสัตว์หนีหายไปให้ถือว่าสัตว์เป็นโรคพิษสุนัขบ้า
4. รีบไปหาแพทย์ หรือสัตวแพทย์ทันทีที่ถูกกัด เพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน และเซรุ่มอย่ารอจนสัตว์ที่กัดตาย เมื่อสัตว์ตาย รีบตัดหัว ส่งตรวจโรคพิษสุนัขบ้า

